คีรอยด์ keloids



เป็นแผลเป็นที่เกิดจากเนื้อเยื่อสร้างใหม่มากกว่าปกติ สามารถเกิดทุกทีในร่างกายเมื่อได้รับบาดเจ็บ เช่น แผลไฟลวก สิวขนาดใหญ่ รอยขีดข่วน

สาเหตุ



เกิดจากการสร้างเนื้อเยื่อมากกเกินไปเมื่อแผลกำลังสมาน ไม่มีใครทราบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัด ไม่ใช่สิ่งติดต่อกันได้และไม่ใช่เนื้อเยื่อที่จะกลายเป็นมะเร็งได้ คีรอยด์เกิดได้กับทุกคนทุกสภาพผิว

อาการ

คีรอยด์จะมีวัการะเป็นก้อนสีชมพูนูนขึ้นมาอาจจะสีดำหรือแดงก้ได้เกิดเป็นแผลเป็นจากแผลที่เกิดบนผิวหนัง หรืออาจจะเริ่มจากแผลเล็กๆเช่นแผลเจาะหู เนื้อเยอะจะเพิ่มขนาดขึ้นแต่สีจะซีดลง คีรอยด์จะต่างจากการที่เนื้อเยื่อแผลเป็นที่สร้างตัวมากเกินไป ซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนไม่สม่ำเสมอ และแดง และไม่ได้เกิดจากรอยสมานแผลซึ่งจะมีขนาดเล็กลงได้และซีดลง ทั้งเนื้อเยื่อแผลเป็นและคีรอยด์ ไม่เจ็บแต่คัน ถ้าเกิดที่ตรงบริเวณที่ข้อพับอาจจะลำบากในการเคลื่อนไหวร่างกาย



วินิจฉัย

ดูลักษณะแผลเป็นของผู้ป่วย

อ้างอิงข้อมูล : Fred Ferri.(2011).Ferri's Netter Patient Advisor.Retrived April 29, 2019, from www.netterreference.com

การรักษา




ไม่มีการรักษาที่ได้ผลเท่าไหร่นัก สำหรับคีรอยด์ป้องกันไม่เกิดจะดีกว่า หลีกเลี่ยงการเจาะ สัก หรือการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น การรักษามีหลากหลายแตกต่างกันไป บางคนก็หายบางคนก้อาจจะกลับมาเป็นอีกในที่เดิม การรักษาอย่างเช่น ผ่าตัด ฉีดเสตียรอยด์ ฟีสให้แข็ง หรือเลเซอร์ ซึ่งการผ่าตัดไม่ค่อยได้ผลดีนัก บางทีกลับมมีขนาดใหญ่กว่าเดิม ฉีดสเตียรอยด์ทำให้คีรอยด์เล็กลง ฟีสซึ่งคือทำให้คีรอยด์แฟบตัวลง เลเซอร์ทำให้คีรอยด์จางลงและแฟบลง วิธีใหม่รวมถึงการให้ยาคีโม interferon ครีม immiquimod retinoic acid tacrolimus ยาเหล่านี้บางทีก็ประสบความสำเร็จในการรักษา

ควรไม่ควร

✓ควรหาสิ่งปกปิดคีรอยด์หากรู้สึกว่ามีผลต่อชีวิตประจำวัน

✓ควรใช้ชีวิตปกติ แข็งแรง ไม่มีข้อห้ามเกี่ยวกับคีรอยด์

✓ควรรีบปรึกษาแพทย์หากพบสัญญาณว่าจะเกิดคีรอยด์



×ไม่ควร เจาะ สัก หรือผ่าตัดใดๆโดยไม่จำเป็น หากคุณเคยเป็นคีรอยด์มาก่อน

อ้างอิงข้อมูล : Fred Ferri.(2011).Ferri's Netter Patient Advisor.Retrived April 29, 2019, from www.netterreference.com