โรคไฟลามทุ่ง

เกิดจากการติดเชื้อบริเวณผิวหนังและเนื้อเยื่อดานใต้บริเวณนั้น



สาเหตุ

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ group A streptococci ซึ่งการติดเชื้อเกิดในคนปกติที่ไม่ดีปัญหาสุขภาพที่อายุน้อยๆหรือแก่มากๆหรือผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง(AIDS)หรือผู้เชื้อHIV ผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ที่ติดเหล้าก็มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้ได้ หรือเป็นแผลหลังจากการผ่าตัด

อาการ



จะรู้สึกเจ็บที่ผิวหนัง ปวดบวมแดงร้อนและแตกเป็นขอบๆ ตุ่มน้ำใสเล็กใหญ่พุดขึ้นตามบริเวณที่บวมแดง การติดเชื้อนี้สามารถเกิดบนใบหน้าแต่ส่วนใหญ่เกิดที่ขามากกว่า หรือเกิดขึ้นหลังทำบายพาสหัวใจบริเวณใกล้เส้นเลือดดำ อาการอื่น เช่น มีไข้หนาวสั่น ปวดหัว เหนื่อย ไม่อยากอาหาร ปวดท้อง ต่อมน้ำเหลืองโต



วินิจฉัย

จากการดูประวัติการรักษาที่ผ่านมาและตรวจร่างกาย เก็บตัวอย่างเมือกตามโพรงจมูกและลำคอไปเพาะเชื้อ หาเชื้อstreptococcus ตรวจเลือดดูเม็ดเลือดขาว ถ้ามีจำนวนเยอะขึ้นบ่บอกถึงการติดเชื้อ

อ้างอิงข้อมูล : Fred Ferri.(2011).Ferri's Netter Patient Advisor.Retrived April 29, 2019, from www.netterreference.com

รักษา

ใช้ยาปฏิชีวนะเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ติดเชื้อบ่อยหรือรุนแรง ถ้ารักษาถูกต้องอาการจะหายไปภายในไม่กี่วัน หากไม่รีบรักษา จะกลายเป็นฝีหนอง ติดเชื้อเข้ากระแสเลือด อวัยวะส่วนปลายขาดเลือดและเนื้อเยื่อตาย ซึ่งปัญหาเหล่านี้มักเกิดในกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ำเช่น เบาหวาน ติดเหล้า

ควรไม่ควร


✓ควรวางขาให้เหมาะสมเพื่อช่วยเรื่องการบวม

✓ควรแยกซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว จากผู้อื่นโดยใช้น้ำร้อนซัก

✓ควรกินยาปฏิชีวะให้หมดถึงแม้แผลจะหายดีแล้ว

✓ควรรีบปรึกษาแพทย์หากยาปฏิชีวนะไม่ได้ผลและมีอาการบวมแดงมากขึ้น

✓ควรพบแพทย์หากมีไข้หนาวสั่นหรือมึนหัวขณะยืนขึ้น หรือ หัวใจเต้นเร็ว



✗ไม่ควรหยุดยาปฏิชีวนะ แม้อาการจะดีขึ้นแล้วเพราะโรคไฟลามทุ่งเป็นการติดเชื้อที่รุนแรงดังนั้นต้องกินยาให้หมดตามแพทย์สั่ง

✗ไม่ควรประคมทาครีมหรือโลชั่นลงบนแผล ถ้าแตกเป็นแผลใช้ผ้าก๊อสธรรมดาพันไว้

✗ไม่ควรให้คนในครอบครัวใช้ผ้าเช็ดตัวหรือของใช้ร่วมเพราะอาจจะได้รับเชื้อแบคทีเรียจากแผลติดไปด้วย

อ้างอิงข้อมูล : Fred Ferri.(2011).Ferri's Netter Patient Advisor.Retrived April 29, 2019, from www.netterreference.com